




โรคฉี่หนู Leptospirosis



กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในฉี่ของหนู โค กระบือ สุกร สุนัข ที่ปนเปื้อน
ในน้ำเข้าสู่ร่างกายจากการกินอาหาร น้ำดื่ม และรอยแผลตามผิวหนัง

อาการ



ไข้สูง



ปวดศีรษะ
ตาแดง



ปวดกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะน่อง



คลื่นไส้
อาเจียน




ตัวเหลือง

การป้องกัน



หลีกเลี่ยงการแช่
หรือลุยน้ำ



เกษตรกร
ใช้ถุงมือยาง
และรองเท้าบูต



ควบคุมกำจัดหนู
ในบริเวณที่อยู่อาศัย



ล้างมือ ล้างเท้า
ให้สะอาดหลังลุยน้ำ



ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ແກ່ປສຸສັຕຸ ເຊັ່ນ ໂຄ ກະປື້ວ
ແລະສັຕຸເລີ່ຍ ເຊັ່ນ ສຸນັບ



ข้อมูล : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th



Google play



App Store

สายด่วน
กรมควบคุมโรค

1422

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน เพื่อป้องกันโรคที่นำโดยยุง

หลั่งน้ำท่วม

1. ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด
 - 1.1 นอนในมุ้ง
 - 1.2 ทายากันยุง
 - 1.3 ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และใช้ผ้าสื่อน
2. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านโดย
 - 2.1 ไม่ทิ้งน้ำขัง ตามภาชนะต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ยางรถยนต์ เป็นต้น
 - 2.2 กลบถม แอ่งน้ำขัง หลุม บ่อที่ไม่ใช้
 - 2.3 ปิดภาชนะเก็บน้ำ ไม่ให้ยุงมาวางไข่
 - 2.4 ปิดปากภาชนะเก็บน้ำ
3. ควบคุมยุงพาหะ
 - 3.1 ปล่ายปลากินลูกน้ำ
 - 3.2 ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะน้ำใช้
 - 3.3 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ระบายน้ำ

ซึ่ง พันธ์ศรี ขำยุง



ปล่ายปลากินลูกน้ำ



ปิดปากภาชนะเก็บน้ำ

โรคที่นำโดยยุง



ยุงลายนำโรคไข้เลือดออก



ยุงรำคาญนำโรคเท้าช้าง โรคไข้สมองอักเสบ



ยุงก้นปล่องนำโรคมาลาเรีย



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข